

عوارض جایگزین در ازوفازکتومی

دکتر رضا باقری
فوق تخصص جراحی توراکس
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

✓مردی ۵۵ ساله با سابقه ادنوکارسینوم دیستال مری که بعد از ارزیابی کامل قلبی عروقی و ریوی بدون سابقه بیماری خاصی تحت عمل جراحی THE قرار گرفت. جهت بیمار برای جایگزین از معده استفاده شد و اناستوموز در گردن با دست انجام شد. رای بیمار دو طرف CT تعبیه شد و بیمار با حال عمومی خوب متقل ای سی یو گردید. در صبح روز بعد از عمل بیمار دچار علائم افت هوشیاری، توام با تب ۴۰ درجه گردید. CXR صبح روز بعد از عمل نرمال بود.

بر بالين بیمار چه می کنیم؟

چه اقدامات پاراکلینیکی توصیه می کنید؟

آیا بررسی با کنتراست را توصیه می کنید؟

تشخیص شما چیست؟

اقدام مناسب درمانی چیست؟

✓ انواع جایگزین ها بعد از ازوفازکتومی

۱- معده

۲- کولون

۳- روده باریک

✓ مقایسه دو جایگزین شایع در ازوفازکتومی (معدده ، کولون)

✓ مزایا و معایب؟

چگونه از بروز عارضه ایسکمی و نکروز جلوگیری کنیم؟

• کشش

• چرخش

• ایسکمی

چند نکته تکنیکی :

- مانور کوخر کامل باشد.

- جایگزینی پیلورومیوتومی با پیلوروپلاستی

- لخت شدن قسمت پروگزیمال معده و عدم همراهی انتوم در آن قسمت

- توبولوریزه کردن مناسب معده

- اطمینان از عدم تنش در هنگام اناستوموز

- اطمینان از عدم چرخش در هنگام اناستوموز

- تجویز هپارین در انتهای عمل