

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تشنج های دوران کودکی

❖ تعريف تشنج

❖ تشنجات فوقال

❖ تشنجات جنراليزه

❖ تشنج علامتدار حاد (Acute Symptomatic Seizure)

❖ تشنج برانگیخته نشده (Un Provoked seizure)

تعریف صرع یا اپی لپسی

تشنجات تب دار

❖ تشنج تب دار ساده

❖ تشنج تب دار کمپلکس

❖ استاتوس اپی لپتیکوس تب دار

جدول ۵-۶۱. عوامل خطر مربوط به تکرار تشنج تب‌دار

ماژور

سن زیر یک سال

طول مدت تب کمتر از ۲۴ ساعت

تب $38-39^{\circ}\text{C}$ سانتی‌گراد ($100.4-102.2^{\circ}\text{F}$)

ماینور

سابقه خانوادگی تشنج تب‌دار

سابقه خانوادگی صرع

تشنج تب‌دار کمپلکس

حضور در مراکز نگهداری روزانه

جنس مذکر

پایین بودن سدیم سرم در زمان تشنج

جدول ۶-۱۱. عوامل خطر ایجاد صرع متعاقب، تشنج تب‌دار

ریسک فاکتور	خطر صرع در آینده*
تشنج تب‌دار ساده	۱٪
تشنجات تب‌دار راجعه	۴٪
تشنج تب‌دار کمپلکس (بیش از ۱۵ دقیقه طول بکشد یا در طی ۲۴ ساعت عود کند)	۶٪
تب کمتر از یک ساعت قبل از تشنج تب‌دار	۱۱٪
سابقه خانوادگی صرع	۱۸٪
تشنج تب‌دار کمپلکس (فوکال)	۲۹٪
اختلالات تکامل عصبی	۳۳٪

ژنتیک و سایر عواملی که منجر به تشنج تب دار می شوند

Generalized Epilepsy Febrile seizure plus ❖

❖ سندروم دراوه

❖ صرع لوب تمپورال ثانویه به اسکروز میال تمپورال

evaluation

Histryory ❖

Exam ❖

LP ❖

❖ EEG (الکتروانسفالوگرام)

❖ بررسی های خونی

❖ تصویربرداری های مغز (Imaging)

درمان

با تشکر از
توجه شما

