

نکات پرستاری داروی فعال کننده پلاسمینوژن بافتی

Dr. Mohammad Taher

نکات پرستاری داروی فعال کننده پلاسمینوژن بافتی

قبل از تزریق:

بررسی کامل بیمار و به دست آوردن اطلاعات پایه و اخذ تاریخچه دقیق از وضعیت بیمار

عدم وجود شواهد تروما به سر در طی ۳ ماه گذشته

عدم وجود شواهد خون ریزی فعال

عدم وجود خون ریزی گوارشی و ادراری در طی ۳ هفته گذشته

نداشتن جراحی مازور در طی ۱۴ روز گذشته

عدم مصرف ضد انعقاد خوراکی

عدم وجود تشنج در زمان وقوع سکته مغزی

کنترل قند خون

نکات پرستاری داروی فعال کننده پلاسمینوزن بافتی

قبل از تزریق:

عدم وجود شواهد خون ریزی فعال و ترومای حاد

عدم وجود شواهد از خون ریزی داخل مغزی

فشار خون زیر ۱۷۰ میلی متر جیوه برای سیستولیک و ۱۱۰ میلی متر جیوه برای دیاستولیک

توجه به آزمایشات انعقادی: $INR < 1.7$ و $PTT < 50$ و پلاکت ها بیشتر از ۱۰۰۰۰۰

عدم استفاده از هپارین در ۴۸ ساعت گذشته

تعیین دقیق وضعیت و سطح هوشیاری

برقراری دو خط وریدی

نکات پرستاری داروی فعال کننده پلاسمینوژن بافتی

حین تزریق:

و تزریق برای بیمار حتما تحت مانیتورینگ انجام می شود
وضعیت بیمار از نظر بروز و ایجاد خون ریزی
محل های مورد ملاحظه از نظر خون ریزی: محل های تزریق های قبلی، بروز هماچوری،
خون ریزی از دستگاه گوارش و لثه ها
بروز خون ریزی های داخلی: تغییر در علائم حیاتی (کاهش فشار خون، افزایش تعداد نبض
و تنفس
تغییرات نورولوژیکی: (سردرد، اختلال در سطح هوشیاری، اختلال بینایی)

نکات پرستاری داروی فعال کننده پلاسمینوژن بافتی

حین تزریق:

کنترل مداوم علائم حیاتی

کنترل مداوم سطح هوشیاری هر ۱۵ دقیقه

اگر بیمار دچار سردرد شدید، فشار خون حاد، تهوع یا استفراغ شد یا معاینه عصبی بدتر شد، انفوزیون را قطع کنید و سی تی اسکن اورژانسی را انجام دهید.

مانیتورینگ کردن بیمار از نظر بروز دیس ریتمی های قلبی.

نکات پرستاری داروی فعال کننده پلاسمینوژن بافتی

بعد از تزریق:

کنترل وضعیت نورولوژیک در یک ساعت اول بعد از قطع دارو هر ۱۵ دقیقه

کنترل وضعیت نورولوژیک در ۶ ساعت اول بعد از قطع دارو هر ۳۰ دقیقه

کنترل وضعیت فشارخون در ۱ ساعت اول بعد از قطع دارو هر ۱۵ دقیقه

کنترل وضعیت فشارخون در ۶ ساعت اول بعد از قطع دارو هر ۳۰ دقیقه

تا ۲۴ ساعت بیمار را از نظر بروز خون ریزی کنترل کنید

کنترل PT و PTT و Hb

تا ۲۴ ساعت از قرار دادن انواع کاتتر مانند NGT خود داری کنید.

نکات پرستاری داروی فعال کننده پلاسمینوژن بافتی

بعد از تزریق:

بروز واکنش آلرژیک نادر است، در صورت بروز از آنتی هیستامین ها و کورتیکواستروئیدها استفاده می شود.

تکرار CT اسکن مغز ۲۴ ساعت بعد از دریافت دارو

تا ۲۴ ساعت بعد از تهیه نمونه خون حداقل به مدت ۲۰ دقیقه محل مورد نظر را فشار دهید.





Dr. Mohammad Taher