


عوارض سقط غیرقانونی

دکتر زهرا حمیدی مدنی
متخصص زنان و زایمان
استایار دانشگاه علوم پزشکی
گیلان

**ВЫИДАШ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ БАБКОЙ ИЛИ АКУШЕРКОЮ,
НЕ ТОЛЬКО КАЛЕЧИТ ЖЕНЩИНУ, НО ЧАСТО ВЕДЕТ К СМЕРТИ.**



♦ У ПОВИТУХИ ♦




♦ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫИДАША ♦

**ВСЯКИЙ
ВЫИДАШ
ВРЕДЕН.**



♦ СМЕРТЬ ОТ ВЫИДАША ♦

**БАБКА
И АКУШЕРКА,
ПРОИЗВОДИЩАЯ
ВЫИДАШ,
СОВЕРШАЕТ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ.**



سقط عمدی یکی از پدیده هایی است که در سراسر جهان مشاهده میشود و فارغ از قانونی یا غیر قانونی بودن آن، بر اساس مقررات هر کشور، در بیشتر جوامع جهان به عنوان امری غیر عادی تلقی میشود.

براساس اعلام وزارت بهداشت، سالانه بین 300 تا 400 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور، انجام می‌شود .

سقط جنین نا ایمن هزینه اقتصادی زیادی دارد زیرا بیشتر روش های ناقص نیاز به مداخلات بعدی و مراقبت بعدی در بیمارستان دارد.


سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار میگیرد.

وقوع میزان چشمگیر سقطهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقطهای غیرایمن از جوامع در حال توسعه به ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران آشکار میسازد.

طبق آمار و ارقام موجود، یک سوم کل بارداری ها به طور ناخواسته شکل میگیرد.

۴۰ درصد از این تعداد در نهایت به سقط عمد منجر میگردد..

از هر ۴۶ میلیون انجام سقط عمدی که هر ساله در سراسر دنیا صورت میگیرد، حدود ۲۰ میلیون آن مربوط به کشورهایی بوده که در آن ها، سقط خودخواسته غیرقانونی است.



بی توجهی به عوارض روش های
غیر علمی سقط جنین سبب آمار
بالای مرگ و میر زنان میشود به
طوری که هر ۹ دقیقه یک زن در
اثر عوارض شدید سقط های غیر
قانونی و پر خطر جان خود را از
دست میدهد.

سقط غير ايمن:

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سقط غیر ایمن عملی است که در آن حاملگی توسط یک فرد فاقد مهارتهای لازم یا استفاده از روشهای خطرناک یا در محیطی که حداقل استانداردهای لازم را ندارد یا ترکیبی از هر دو مورد یاد شده پایان می یابد.

روش های خطرناکی از جمله فرو بردن پر ، تیکه چوب، سیم، میل بافتنی ،استفاده از سموم شیمیایی،پرش از ارتفاع و یا ضربه به شکم ، استفاده از نمک های فلزات،سرب، فسفر،کلروکین ،داروهای گیاهی،هورمونی، شوینده و نیزبکار برده می شود.

در اکثر موارد سقط توسط افراد غیر مجاز و آموزش ندیده در شرایط غیربهداشتی و در خفا صورت میگیرد.

عوارض سقط غیرقانونی برای مادر

مرگ مادر

خون ریزی شدید و غیر قابل کنترل پس از سقط

عفونت

آسیب شدید و جبران ناپذیر به رحم (هیستریکتومی-آشرمین)

آسیب به احشا شکمی

سایر عوارض سقط غیرقانونی

آسیب روحی روانی

هزینه اقتصادی ، از آنجایی که روش ناقص نیاز به مداخلات بعدی و مراقبت بیمارستانی دارد.

ریسک عوارض ایجاد شده تا حد زیادی با مهارت
عامل، تجهیزات و امکانات رابطه عکس دارد.

در کشورهایی با منابع محدود در سال 2015 تخمین زده شده که حدود 7 میلیون زن به علت عوارض مربوط به سقط نا مطمئن تحت درمان قرار گرفتند.



Chief Executive Officer

Chief Operations Officer



زنان در کشورهای دارای منابع محدود با شیوع 6.9 به ازای هر 1000 زن تحت درمان عوارض ناشی از سقط نا ایمن قرار گرفته اند.

مرگ :

4.7-13.2 درصد مرگ های مادری ناشی از سقط است.

مناطق دارای منابع (30 مرگ به ازای هر 100000) سقط غیرقانونی اتفاق می افتد.

مناطق کم منابع (220 مرگ به ازای هر 100000) سقط غیر قانونی اتفاق می افتد.

520 مرگ به ازای هر 100000 نفر در جنوب آفریقا

مرگ و میر ناشی از سقط در کشورهای مختلف شیوع 1-41.9 درصد دارد.

مدیریت :

ارزیابی اولیه شامل بررسی علائم حیاتی ، تعیین سن بارداری، معاینه کامل شکم و لگن، تعیین حجم خون ریزی است

ارزیابی در صورت نیاز به جراحی اورژانس (شوک- شکم حاد- خون ریزی شدید – عفونت)

در صورتی که در مراکز درمانی امکانات لازم وجود نداشته باشد باید بیمار استیبل و به مرکز بالاتر ارجاع شود

این اقدامات شامل تثبیت راه هوایی –تعبیه رگ مناسب –احیا با مایعات مناسب- کنترل خون ریزی (میزوپروستول –متیل ارگونوین- بالون داخل رحمی)

خون ریزی :

یک عارضه بسیار شایع سقط غیرقانونی است .

می تواند منجر به شوک هیپوولمیک ، مرگ و یا انعقاد داخل عروقی منتشر شود.

می تواند ناشی از پارگی سرویکس ، رحم ، واژن ، آسیب به عروق تخمدانی و یا آتونی باشد.

باقی ماندن محصول بارداری یکی از شایع ترین علل خون ریزی به دنبال سقط غیرقانونی است .

خون ریزی پس از سقط اگر در محدوده ی نرمال باشد و تحت مراقبت های دقیق صورت گیرد قابل کنترل و طبیعی محسوب می شود.

اما اگر روش های غیر علمی سقط جنین منجر به مواردی همچون سوراخ شدن رحم یا دهانه رحم گردد، نتیجه ی آن از دست رفتن حجم بسیار زیاد خون و عفونت های شدید است. در این صورت تنها راه نجات جان فرد، انجام عمل جراحی و انتقال خون به همراه تجویز آنتی بیوتیک و داروهای خاصی است.

در صورتی که خون ریزی ناشی از آتونی رحم باشد ، اقدامات اولیه شامل ماساژ رحمی، استفاده از یوتروتونیک ها ، استفاده از بالون های داخل رحمی جهت کنترل خون ریزی استفاده می شود.

در صورتی که خون ریزی ناشی از باقی ماندن محصولات بارداری باشد بیمار باید تحت درمان تخلیه ایی با روش مناسب قرار بگیرد.

در این شرایط باید پوشش انتی بیوتیک وسیع الطیف را مدنظر قرار داد.

عفونت :

می تواند ناشی از باقی ماندن محصولات بارداری_تروما به بافت-استفاده از وسایل غیراستریل ایجاد شود.

در صورت عدم درمان به موقع می تواند منجر به مرگ مادر ، انعقاد داخل عروقی منتشر، ناباروری زن شود.

بیمار معمولا با علائمی مانند تب، لرز، درد زیر شکم ، ترشحات واژینال بدبو مراجعه می کند.

سقط ناقص :

در سقط های القایی خود به خودی و یا در صورت انجام توسط اشخاص نابلد و یا سن بارداری بالاتر شایع تر است.

در صورت حضور آناتومی غیرطبیعی رحمی نیز بیشتر اتفاق می افتد.

با علایمی مانند تداوم خون ریزی مراجعه می کند.

تروما :

وارد کردن جسم خارجی جهت تخلیه رحم یکی از علل تروما در رابطه با سقط غیرقانونی است.

علاوه بر آسیب به دستگاه تناسلی می تواند باعث آسیب به احشا داخل شکم از جمله روده ،..... شود.

پارگی رحم یکی از شایع ترین آسیب های دستگاه تناسلی است که می تواند در زمینه دستکاری اتفاق بیفتد و حتی منجر به هیستریکتومی و ناباروی شود.

عوارض دارویی:

از آنجایی که بیشتر این سقط ها در مکان نامناسب و توسط افرادی که تبحر کافی ندارند انجام می شود ممکن است از داروهای غیر استاندارد و یا دوزهای غیر استاندارد استفاده شود و تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

با توجه به اینکه این داروها از طریق قاچاق در اختیار افراد قرار می گیرند، معمولاً تاریخ مصرف آنها گذشته و باعث بروز مشکلات زیادی از جمله خونریزی، عفونت و شوک باکتریال می شوند.

افسردگی :

غم و اندوه واکنش طبیعی به از دست دادن بارداری و سقط جنین است. و طبیعی است که پس از مدتی بهبود می یابند.

اما در صورتی که بعد از سقط به مدت طولانی بعد از سقط علائمی مانند: بی علاقی به انجام فعالیت های معمول_احساس خستگی-اختلال در تمرکز-افکار خودکشی-اضافه وزن و یا کاهش وزن دیده شود باید بررسی کامل صورت بگیرد.

در بررسیهای انجام شده، دیده شده است که اختلالات خلقی از جمله افسردگی در خانمهایی که سابقه سقط دارند بیشتر است.

احتمال بروز افسردگی با تعداد سقط افزایش مییابد.

اختلال اضطرابی :

براساس نتایج مطالعات اضطراب و اختلالات استرسی پس از سقط جنین حتی بیشتر از افسردگی اتفاق می افتد.

حتی ممکن است این افراد دچار اختلال اضطراب بعد از حادثه نیز شوند.

سوء مصرف مواد: بر اساس برخی مطالعات بین
المللی انجام شده، احتمال سوء مصرف مواد در
زنانی که سقط عمدی را تجربه کرده‌اند از زنانی که
این سابقه را ندارند بالاتر است.

احساس گناه و شرمساری: یکی از پیامدهای سقط عمدی در زنان، احساس مشارکت در گناه و شرمساری از انجام این امر است.

کیفیت زندگی و روابط زناشویی: بر اساس مطالعات انجام شده، کاهش کیفیت زندگی و روابط زناشویی در زنانی که سقط عمدی را تجربه کرده اند در مقایسه با زنانی که چنین تجربه ای را ندارند بیشتر دیده شده است.

یکی از مهمترین دلایلی که افراد به مشکلات عاطفی و روانی پس از سقط دچار میشوند، احساس گناه در از بین بردن نوزادی بیگناه است.

ناباروری نیز از عوارض سقط است و میتواند هزینه های زیادی را برای خدمات درمانی مورد نیاز به سیستم دولت یا خود فرد تحمیل کند

مواردی که باید زوج خواهان سقط القایی (عمدی) بدانند:

یکی از زیباترین احساسات، احساس مادر و پدر شدن است. بررسی های داخل کشور نشان میدهد که بیش از 80 درصد زوجینی که خواهان فرزند بوده اند به دلیل تجربه و تداوم احساس مادر و پدر بودن بارداری را برنامه ریزی کرده اند.

زوجین باید از عوارضی که سقط جنین برای سلامت جسمی مادر و نیز سلامت روانی و اجتماعی پدر و مادر ایجاد خواهد کرد، آگاه باشند.

زوجین باید بدانند که در سقط احتمال موفق نبودن اقدام وجود دارد. آنها باید بدانند که به همین دلیل احتمال بروز مشکلات بعدی برای فرزند آنها وجود دارد و به همین دلیل باید از انجام سقط پرهیز کنند

THANK YOU