



عوارض اجتماعی سقط

دکتر آبتین حیدرزاده

دانشیار پزشکی اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عواقب فردی سقط

- اختلالات اشتها
- مشکلات ارتباطی
- احساس گناه
- افسردگی
- فلاش بک های سقط جنین
- افکار خودکشی
- اختلال عملکرد جنسی
- سوء مصرف الکل و مواد مخدر
- پیامدهای معنوی

عوارض خانوادگی سقط

Women's Health after Abortion: The Medical and Psychological Evidence

Note:

It is beyond the scope of our book to deal with the massive question of sex-selection abortion, which has resulted in a deficit of at least 100 million women in the world, according to one widely-accepted estimate.¹

Abortion and Interpersonal Relationships

Abortion never occurs within a relationship vacuum. Whether the abortion is shared or not, many significant others can be impacted.²

عوارض خانوادگی سقط

- گسست زناشویی و انحلال رابطه
- جدایی آغاز شده توسط مرد
- تضاد بیشتر و اعتماد متقابل کمتر
- زنانی که احساس شرم یا عصبانیت می کنند ممکن است پس از سقط جنین دچار مشکلات جنسی شوند
- یک زن ممکن است احساس کند همسرش او را مجبور به سقط جنین کرده است، و به او خیانت شده است
- والدین و سقط جنین
- کودکان پس از سقط جنین
- سوء استفاده یا غفلت

عوارض اجتماعی سقط

**Induced abortion during youth:
social inequalities in the outcome
of the first pregnancy**

Aborto provocado na juventude:
desigualdades sociais no desfecho
da primeira gravidez



**Global Public Health: An International
Journal for Research, Policy and
Practice**

Publication details, including instructions for authors and
subscription information:

<http://www.tandfonline.com/loi/rgph20>

**Social stigma and disclosure about
induced abortion: Results from an
exploratory study**

Kristen M. Shellenberg^a, Ann M. Moore^b, Akinrinola Bankole^b,
Fatima Juarez^c, Adekunbi Kehinde Omideyi^d, Nancy Palomino^e,
Zeba Sathar^f, Susheela Singh^b & Amy O. Tsui^f

^a Ipas, Chapel Hill, NC, USA

^b Guttmacher Institute, New York, NY, USA

^c Centro de Estudios Demograficos, Urbanos y Ambientales, El
Colegio de México, D.F., Mexico

Current Commentary

Stigma and Abortion Complications in the United States

Lisa H. Harris, MD, PhD

روند اجتماعی انگ سقط جنین

سقط جنین را به عنوان یک رویداد غیرطبیعی و زنانی را که دارای آن هستند به عنوان منحرف برچسب می زنند

زنانی را که سقط جنین می کنند با ویژگی هایی مانند بی بندوباری، بی احتیاطی، خودخواهی و عدم دلسوزی نسبت به زندگی انسانی مرتبط می کنند.

"ما" از "آنها" جدا می شود (افراد دارای برچسب در دسته بندی قرار می گیرند)

زنان احساس خجالت، شرم، گناه و ترس از افشای اطلاعات می کنند - به طور موثر آنها را از بحث در مورد تجربه خود ساکت می کند.

یک زن ممکن است در نتیجه آشکار شدن داوطلبانه یا غیرارادی سقط جنین، دوری، طرد یا تبعیض را تجربه کند.

در جهان چه می گویند؟

- به طور کلی در جامعه وقتی مردم متوجه می شوند که یک زن سقط جنین کرده، وحشت می کنند، می گویند زن بدی است و با او بد رفتار می کنند. (زن، مکزیک)
- هنگامی که سقط جنین می کنند، خداوند آنها را مجازات می کند، [. .] وقتی آنها اولین فرزند خود را می کشند، دیگر نمی توانند آن را به دنیا بیاورند. (زن، پرو)
- سقط جنین یک عمل گناه است. نگران بودم که دخترم مریض شده باشد چون سقط کردم. وقتی شوهرم از سقط جنین مطلع شد، شروع کرد به گفتن اینکه من بخاطر سقط جنین مجازات می شوم. (زن، پاکستان)

Proportion of lifetime terminated pregnancies among ever-married women aged 15–54 years by selected social and demographic characteristics, 2005 Iran Low Fertility Survey ($n = 5526$)

Characteristics	Induced abortions	Spontaneous abortions	Total
Region of residence			
Yazd	0.004	0.158	0.162
Isfahan	0.010	0.163	0.173
Gilan	0.085	0.133	0.218
Tehran city	0.159	0.315	0.475
Level of education			
Illiterate/elementary	0.012	0.054	0.066
Secondary	0.113	0.303	0.416
Diploma or more	0.189	0.351	0.540
Age at pregnancy, y			
<25	0.012	0.070	0.082
25–29	0.067	0.202	0.268
≥30	0.210	0.251	0.461
Pregnancy order			0.000
First	0.008	0.145	0.153
Second	0.049	0.192	0.241
Third	0.159	0.301	0.461
Fourth or higher	0.087	0.133	0.220
Pregnancy cohort			
<1985	0.017	0.097	0.114
1985–1994	0.040	0.100	0.140
1995–2005	0.107	0.244	0.351

چه کار باید کرد؟

- راه اندازی مشاوره قبل از سقط در نظام سلامت
- راه اندازی مشاوره بعد از سقط در نظام سلامت

تشکر از توجه شما